

# FITOMAX-gold



**Miscela di  
microelementi**

**CONCIME CE  
MISCELA DI MICROELEMENTI  
boro (B) (calcio) e manganese (Mn) (solfato)  
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA.  
Materie prime: borato di calcio, sale di manganese  
(solfato)**

## COMPOSIZIONE

BORO (B) totale 4,5%  
MANGANESE (Mn) solubile in acqua 0,5%  
Da utilizzare solo nel caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

BOR (B) gesamt 4,5%  
Wasserlösliches MANGAN (Mn) 0,5%  
Nur bei Bedarf anwenden. Die angegebenen Aufwandmengen sollen eingehalten werden.

La rugginosità delle mele frequentemente è riferito ad una caratteristica varietale, più spesso nelle zone di pianura ed anche nel caso in cui non vengono rispettati gli opportuni accorgimenti nella lotta antiparassitaria.

Oltre l'impiego nei casi post-fiorali dei formulati meno potenti, è consigliato utilizzare **FITOMAX-gold** secondo i dosaggi di seguito indicati.

Das Phänomen der Berostung von Äpfeln ist meist ein Sortenmerkmal, kommt häufiger im Flachland vor und kann von ungünstigen Pflanzenschutzmaßnahmen gefördert werden.

Neben dem Einsatz von schonenden Pflanzenschutzmitteln wird zur Verminderung der Berostung. FITOMAX –Gold wie folgt empfohlen:

## MODO D'USO

COLTURA	FOGLIARE dosaggio (g/hl)	INTERVENTO
Frutticoltura		
Pomacee (melo, pero cotogno)	200	Un trattamento allo stadio dei bottoni rosa e 4-6 interventi in post-fioritura distanziati di 6-10 giorni.

**FITOMAX-gold** può essere miscelato alle poltiglie fungicide normalmente impiegate su tutte le varietà. Dose massima per ettaro per anno di microelementi Boro (B) 1 kg/ha/anno.

Da non vendersi sfuso, non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati, pur tuttavia è sempre consigliabile effettuare piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

## Empfehlungen

Cultivar	Dosis	Behandlungen
Kernobst (Apfel, Birne und Quitte)	200 g/hl	Die erste Behandlung soll in der Phase des Rotknochenstadiums und 4-6 Einsätze weitere sollen in der Nachblüte im Abstand von 6-10 Tage erfolgen.

Fitomax Gold kann in der Regel mit den meisten Pflanzenschutzmittel gemischt werden.

Maximale Dosis pro Hektar und Jahr von Spurenelementen:

Bor 1 kg/ha

Darf nur in verschlossener Originalverpackung verkauft werden. Leere Behälter sind nach Gebrauch zu entsorgen.

Kontakt mit Augen und Haut sollen vermieden werden.

CAOLINO 60%  
KAOLIN 60%

Peso netto: 10 Kg.  
Reingewicht: 10 kg



Fabbricante: / Hersteller:  
SALA srl – Corso Matteotti, 109 – 36071 Arzignano (VI) – Italy  
Tel. 0444/ 453590 r.a. – Fax 0444 455619  
www.salaconcimi.it e-mail: info@salaconcimi.it

**Lotto N°  
Menge N°**