P-MAX

P_2O_5 54

P-MAX, è un formulato ad alto tenore di fosforo (54%) per applicazioni fogliari ed in fertirrigazione, consigliato soprattutto all'inizio del periodo vegetativo.

Il fosforo, oltre a regolare il metabolismo dei carboidrati, sviluppa maggiormente l'apparato radicale delle piante, incrementando anche la superficie delle foglie dei frutti e dei semi.

P-MAX, applicato in fertirrigazione permette una concimazione fosfatica di fondo, generando un ambiente con pH ottimale per sfruttare la fertilità del terreno.

Confezioni: taniche da ***1-5-25-250-1200 kg.***

Concime minerale semplice
Acido fosforico
Anidride fosforica (P_2O_5) totale da acido ortofosforico **54%**

DOSI CONSIGLIATE

COLTURA	Fertirrigazione dose consigliata kg/ha (per intervento)	INTERVENTI
FRUTTICOLTURA		
Pomacee (melo, pero, cotogno)	50-60	2-3 interventi dalla fioritura allo sviluppo dei frutti
Drupacee (susino, pesco, ciliegio, albicocco)	60-70	2-3 interventi dalla fioritura allo sviluppo dei frutti
Vite, uva da tavola, kiwi	40-50	3-4 interventi in pieno sviluppo vegetativo
Olivo	40	2-3 interventi dalla fioritura allo sviluppo dei frutti
Agrumi	35-45	2-3 interventi in fioritura e post-allegagione
ORTICOLTURA		
Pomodoro	30-40	3-4 interventi post-trapianto e fioritura
Peperone, melanzana, zucchino, cetriolo	45-55	2-3 int. post-trapianto e durante ciclo vegetativo
Anguria, melone	50-60	2-3 interventi post-trapianto e allegagione
Fragola	40-50	2-3 interventi fioritura, allegagione, invaiatura
Carciofo	40-50	2-3 interventi durante il ciclo produttivo
COLTURE FLORICOLE	30-40	1-2 interventi al trapianto
COLTURE ESTENSIVE		
Frumento tenero, frumento duro, farro, orzo, avena	20-30	1-2 interventi a fine inverno

N.B.: le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

Nell'utilizzo del prodotto il quantitativo ideale per ogni terreno e l'eventuale miscela con altri prodotti, dovrà essere valutata anche sulla base delle analisi del terreno e dall'esperienza dell'agricoltore.
Da non miscelare con prodotti alcalini (e nemmeno con prodotti contenenti zolfo nel caso di utilizzo per via fogliare).